

Mémoire pour aider à Déterminer Le Lieu de L'épanchement,
Dans Les Lésions de La tête par Contre-coup; Et Son Dépôt
De fausse interne qui peuvent se former sous Le crâne, par Le
Sieur Brillard Chirurgien major ordinaire De La Marine et Du
Corps Royal De L'artillerie à Brest.

La nature seule doit parler Dans Les observations.

Monsieur Guenoy, Remarque sur L'usage Des observations, tome
premier Des Mémoires De L'Académie Royale De Chirurgie.

Si Les causes de plusieurs maladies du corps humain ne peuvent être
suffisamment développées, pour nous en faire connaître sûrement Les
Différentes affections, et tirer un diagnostic qui puisse nous diriger Dans L'emploi
Des moyens curatifs; il est donc pour nous d'une nécessité indispensable De nous
appliquer à en étudier Les effets: Les meilleurs esprits regardent
L'observation comme Le moyen le plus certain de parvenir à étendre nos
connaissances: on ne peut trop Les multiplier; mais en Les faisant, il faut
apporter une attention scrupuleuse à une infinité de circonstances, même
minutieuses en apparence; mais dont cependant on peut quelque fois
tirer des traits d'illumination que L'on chercherait inutilement Dans Les
plus sublimes spéculations.

Le diagnostic de contre-coup a été L'objet de recherches de plus grands
chirurgiens; quoiqu'il nous en soit parvenu de beaucoup à leurs travaux; il nous reste
peut-être encore plus à découvrir: un académicien célèbre (a) aussi savant que zélé pour
Les progrès de la chirurgie; a dit que cette matière étoit d'une des plus difficiles
De L'art; et tel grand Nosocrate (b) appelle pour s'en rendre compte
Point de mettre sur Les papiers ce qu'il devoit observer; pas d'avant dit-il pas trop
de précipitation, on peut oublier quelque chose d'essentiel, qui n'aurait pas pu
être échappé à un chirurgien moins habile. Serait-ce à présent pour être
chirurgien qui auroit remarqué quelque chose qui eût échappé à ces grands
maîtres? Les observations qui font L'objet de ce mémoire, mettront Les gens De
L'art en état de se prononcer: mais avant d'entrer Dans ce détail, il est nécessaire De
faire des remarques, que Le principe mécanique qui veille à la conservation de tous
Les êtres animés Leur sert de base.

Personne n'ignore qu'une humeur quelconque, épanchée Dans Les bas ventres ou
Dans La poitrine, ne cause des accidents relatifs aux fonctions de différentes parties
sur Lesquelles elle exerce ses pressions; qu'en conséquence le Malade ne peut
Avoir souffert que Dans telle ou telle position, et qu'il cherche toujours cela Dans La
quelle il peut durer le plus Long-temps, et avec le moins de mal-être possible.
par exemple un homme qui a un épanchement de sang, se penche ou s'allonge Dans Le

(a) M. Louis Diraou Prononcé à l'entrée de L'Académie en 1766.

(b) J'ai cité ces citations sur les pages 319.



ARC 45
n° 72

Dans les épanchements, respect des foyes sur les foyes d'un, parce qu'alors la gravitation du liquide s'écoule, & s'écoulant sur le médiant y cause un sentiment d'oppression insupportable, qui gêne la respiration, suffoque le Malade et l'oblige malgré lui de se coucher sur le côté d'épanchement. Lorsqu'il y a épanchement dans les deux foyes de la poitrine, le Malade ne peut se tenir couché ni sur l'un ni sur l'autre côté; il est forcé de se tenir assis la poitrine penchée en avant. On sait encore que les apitiques, ne peuvent se tenir dans une situation horizontale, parce que la résistance de la colonne du bas ventre, faisant remonter la colonne d'eau vers le diaphragme, l'empêcherait de s'aplanir, et s'opposerait à l'inspiration; ce qui force le Malade à se tenir presque toujours assis le tronc dans une situation à peu près verticale, et même quelque fois penché en avant et un peu sur les foyes; pour empêcher de la sorte autant qu'il est possible les muscles du bas ventre, d'agir antérieurement & s'opposent à la facilité de l'abaissement du diaphragme.

Jusqu'à ce dernier soupçon, la nature tend à la conservation, et ses loix sont simples et uniformes: Les différentes situations que prennent spontanément, les Malades qui ont des épanchements dans le bas ventre et dans la poitrine, pour liquifier les douleurs et la gêne de fonctions; & observent dans ceux qui ont des épanchements, entre le foye et la dure mère, entre le foye et la pie-mère et même dans les anfractuosités du cerveau, comme je le ferai voir: mais pour avoir une idée plus précise du lieu de l'épanchement, et pour s'en rendre la tâche plus facile, relativement aux replis de la dure, et à sa plus forte adhérence à l'endroit de la suture (a) comme je l'ai partagé en six Loges, trois de chaque côté; traçant une ligne de la racine du nez à la protubérance occipitale, et passant par dessus la suture d'ajettée; on aura deux Loges supérieures, deux de part et d'autre et deux de l'occipital: on peut diviser encore la division est imaginée que pour une plus grande précision, et qu'elle ne peut être un obstacle à l'application du trepan sur l'effusion os, ni à sa multiplication, selon l'exigence du cas.

Je ne parlerai de fractures ou séparation de crâne que l'avis peut découvrir, qu'autant qu'elles peuvent nous servir d'objet de comparaison, et nous aider à reconnaître les signes de l'épanchement et du lieu qu'il occupe, dans des cas où nous ne pouvons l'apercevoir, ni en juger par aucune marque extérieure; car nous ne pouvons qu'en porter un jugement d'avis sur les choses dont nous n'avons pas une parfaite connaissance; et ce n'est souvent que par la comparaison de l'homme mort ou mieux formé à celles qui se sont élevées, et en passant du simple au composé; que l'on peut parvenir à découvrir ou constater certaines vérités.

Or si dans une séparation de crâne avec épanchement dans un endroit donné; le blessé affecte par un mouvement maximal, de se coucher de côté de la fracture; ce qui qu'on intente le force à se tenir dans une position, qui est pour lui la moins incommode; parce que le sang qui s'épanche sur la dure mère, s'empêche, tiraille et distend les vaisseaux et les brides qui l'attachent aux os du crâne; ce qui cause un sentiment de mal-être qui oblige le blessé d'affluer une situation moins inquiétante;

(a) ce n'est pas que je sache que la dure mère soit plus adhérente au milieu du foron et de l'occipital qu'ailleurs, mais comme il y a en ces endroits une épaisseur, et quelque fois une épine, qui rendent les os inégalement durs, on ne peut s'en rendre compte qu'en les trepanant, à moins d'un examen direct, tel que la compression du sinus par une aiguille.

ou en se penchant ou se couchant et au levé de l'effort de la
pression est partagée et se fait même pour la plus grande partie, sur les os
qui ne peuvent céder et que l'on sait n'avoir aucune sensibilité; au lieu
que si le Malade se couchoit du côté opposé, tout l'effort de la gravitation
se faisant sur la dure mine; la compression du cerveau seroit plus grande;
ce qui fait voir la sagesse de la nature, qui tend toujours à régler ce qui
l'opprime, et semble montrer au chirurgien ce qui doit faire.
quelques exemples seulement d'appareils, rendront les choses plus sensibles.

I.

Observation

Aufourmelement de 1763 un soldat s'élégamment de venir tomber du haut
d'un monticule que l'on avoit creusé à la mine; il se fit une plaie longitudinale
à la partie inférieure du front, qui s'étendoit depuis le milieu du sourcil droit,
jusqu'à environ trois travers de doigt au-dessus: il ne perdit point de connaissance
dans la chute, et n'eut aucun symptôme d'émotion; il vint très facilement
à l'hôpital des troupes de terre pour se faire soigner; il vouloit même s'en
retourner à son quartier, disant ne souffrir aucune douleur: mais sous son
cassinet de M. Demougeon, chirurgien, major de cet hôpital qui étoit Malade;
j'examinai ce blessé et voyant que je ne decouvris point de fracture dans le
moment; je trouvai cependant une plaie assez considérable pour mériter attention, et l'engageai
à rester à l'hôpital: il fut saigné deux fois, ne se plaignant jamais de
la moindre douleur; mais au bout de cinq à six jours, le bord de la plaie
se souleva, prit une couleur de chair sale rouge, la suppuration devint
forte, la mine et moi-même; alors je ne doutai plus que l'on ne fût en danger.
La face le soir et la tête commencer à s'enflammer; le surlendemain saignure
du bras et du pied; le surlendemain de l'os, on se trouva une fracture qui s'étendoit
de la partie moyenne inférieure du front, jusqu'au bord supérieur.
J'appliquai une compresse de tripan; je ne trouvai point de sang épanché.
Les douleurs augmentèrent, les yeux se fermèrent le second jour
et j'ajoutai la dure mine avec aussi de la dure mine: le blessé mourut,
sans se lever, et je trouvais que la fracture traversoit la voûte orbitaire
et se portoit jusqu'à l'apophyse sphénoïdale. La dure mine étoit gangrenée
dans une étendue fort considérable, à la partie antérieure et supérieure
l'hémisphère droit du cerveau; la pie-mère en plusieurs endroits avoit
plusieurs points de séparation épais et de formation de bourses;
la substance corticale du cerveau, avoit aussi quelques taches de gangrène.
Je ne rapporte cette observation, que parce qu'elle est la première qui m'a fait
naître le soupçon, que les situations que les Malades affectent de prendre dans
certaines Maladies de la tête; pourroient d'être dépendre d'un mécanisme
qui lui y seroit.

quoique ce blessé eut une fracture d'une grande étendue; il n'eut pendant
les sept à huit premiers jours, aucun symptôme qui pût faire soupçonner
la compression du cerveau, et l'opération de tripan ne decouvrit point de
sang épanché sur la dure mine; cependant dans les derniers jours,
le malade étoit non seulement couché du côté de la fracture; mais il
penchoit même quelquefois la tête en bas et du même côté, ce qui



ne pouvoit venir que d'une inflammation. Cela dure même en cet endroit, et me
 Laissa des sujettures que j'eus occasion de vérifier d'année suivante.
 Cette observation nous fait voir, qu'une inflammation, ou un épanchement
 d'artère de la dure mère, peut s'annoncer aussi d'un autre épanchement,
 par la situation foudroyante que le malade affecte d'apprendre: ou si
 un signe univoque, peut nous faire connaître, l'endroit malade; le tripan
 dans ces cas est aussi nécessaire que lorsqu'il y a épanchement.

Le 11^e juillet 1764 Le nommé Charles (a) Gabier (a) de la grande hune sur
 Le vaisseau d'Artois le brillant; pour son indurément dans le port après une
 campagne de St. Domingue; fut blessé au front par une poulie qui tombant
 de 7 à 8 Pieds de haut, se jeta à la hauteur; dans la flutelle ne remportant
 que la grande verge, et de là il fut tombé sur la tête du nommé
 Joseph Vicaire, canonier du vaisseau d'Artois, qui travaillait, sur le pont au
 -dessous de l'infanterie, dont il étoit à quelque distance; mais la flutelle
 de la poulie se brisant, qu'il fut heurté le front contre la culasse
 de l'infanterie.

L'un et l'autre furent blessés à la tête frontale, ou à la partie supérieure
 du crâne de la tête droite, et tous deux après légèrement apparues,
 car il n'avoient qu'une très légère contusion avec excoriation; mais ils
 éprouvèrent les symptômes d'une violente inflammation. Le malade fut
 porté à l'hôpital de la Marine et l'autre à l'hôpital de terre: J'eus
 soin régulièrement chacun deux fois par jour, et à chaque fois
 prescrivis à la longue: on leur administra les mêmes secours,
 soit-à-dire plusieurs saignées tant du bras, que de la jugulaire,
 des Lavemens purgatifs, et des topiques résolutifs.

2^e observation

Trois jours s'écoulèrent sans que le nommé Gabier, prout éprouvât de mieux notable,
 ce qui fit craindre l'infarction ou épanchement, et déterminé à recourir à l'op.
 on ne trouva d'abord aucune altération sensible, mais quelque heure après on
 aperçut une légère contusion qui devint pour le tripan; qui fut fait sur le front:
 on trouva du sang épanché sur la dure mère; la formation devint indépendante
 quelques jours, le malade donna les plus flatteuses espérances de guérison;
 mais à la dernière de joindre la fièvre avec des marques de putridité: il fut
 traité avec tout le possible, sans que rien put le soustraire à la mort,
 qui termina ses jours le 15^e de son accident.

À l'ouverture on trouva une épanchement; le cerveau et sa membrane,
 se trouvant parfaitement sains et dans le meilleur état, ainsi que la vessie et
 l'estomac, dans la poitrine; mais la plus part de l'organe du bras, étoient
 ébranlés, foudroyés et pour ainsi dire gangrenés; ce qui étoit l'effet d'un coup qui s'étoit
 donné en tombant sur la grande verge, qui fut la seule cause de
 sa mort: on vit en effet des marques qu'avant l'opération du tripan, le malade
 n'étoit point foudroyé sur la tête de la contusion, qui étoit celui de l'épanchement;
 qu'il étoit d'abord couché sur la tête endormant et sur le front de son lit, et que le tripan
 ayant donné issue au sang épanché, il resta ensuite toujours couché sur le dos.

(a) Les français donnent aux matelots des noms à faire la manœuvre de leur hune.
 Le nom de Gabier, ou mot espagnol gabier, qui signifie hune, homme qui étoit
 homme de hune.

5.

3^e observation

a l'égard de l'ophtalmie, les accidents de la formation parurent fâcheux, après quelques jours de repos; mais le mal ne dura pas long-temps; les symptômes furent bientôt dissipés, le malade retourna dans l'apoplexie, l'éthérée; alors on ne put plus que lui enlever l'ophtalmie, mais l'ophtalmie étoit de la nature de la fièvre frontale; cependant il ne survint point d'autre accident qui fut d'inconvénient; on différa deux à trois jours à découvrir le malade; on arriva enfin, mais on ne trouva adès aucune marque capable d'indiquer l'opération d'ablation, ce qui la fit encore différer. En me rappelant ce que j'avois remarqué par de fois avant, sur le malade qui fait le sujet de la présente observation, et faisant attention que le dit malade, ne parut absolument point touché que sur le côté de la tête, et qu'il falloit qu'il y eût continuellement percé de lui un homme, pour le garder et l'empêcher de tomber, quoiqu'il étoit tant il étoit en proie à son délire, pour l'apoplexie en bas et de côté, et par la suite de l'usage du saignée qui étoit sur la tête, et le cerveau; je fus bien sûr d'après ce signe pour en assurer, qu'il y avoit un épanchement dans la fosse frontale droite; M. Demontray dont le mérite est dû à son savoir, fournit facilement de l'apoplexie de la fosse, et lorsqu'un malade fut touché le 10^e jour de son épilepsie: on trouva un épanchement prodigieux d'un sang facile, noir qui s'écoula et occupoit toute la fosse frontale et la fosse moyenne de même côté; le sang se décomposoit bientôt, et devint blanc, ce qui facilita son évacuation; mais la suppuration fut longue et très abondante, principalement du côté de la fosse moyenne inférieurement. Il y eut un abcès au cerveau qui suppura long-temps; enfin par la machine de l'ophtalmie se guérit, et le malade a guéri très heureusement; après que la vision de l'œil gauche en a été très affectée.

Cette observation a quelque rapport avec celle de la note 1^{re} où l'on voit que cet habile homme toucha d'un simple doigt, qu'on lui fit que le côté de la tête étoit malade, et qu'il étoit impossible d'abaisser l'impot sans à l'intérieur du coup; par là il la fièvre, le blanchissement, le saignement de nez et l'écoulement ne permettoient pas au malade de se tenir debout ni après et l'obligeoit de se coucher dans la fosse antérieure. Il paroit d'ailleurs par ce que l'on vient d'observer, que le côté de la tête ne pourroit pas être touché que sur le côté de l'épanchement.

D'autre observation. Soignoit le malade qui fait le sujet, lorsque celui parlait de malade et de la tête, qui le mène en état de l'ophtalmie ce qui suit.

4^e observation
communiquée par M.
Duret de la Faculté
de Médecine

Le 20 May 1768. le nommé Charles Hervé, forgeron journalier dans le port, âgé de 40 ans, se présenta à l'hôpital royal de la Marine, ayant un ulcère phagocyte au milieu du front, de la figure et grandeur d'un œuf de pigeon. Le pus qui en découloit étoit épais et en petite quantité. L'ulcère de l'ulcère suivant le rapport du malade, étoit une contusion ou frottement, faite par la chute d'un anneau de fer, au mois de mai 1766. Les bords de l'ulcère étoient élevés et peu sensibles, furent touchés avec l'eau mercurielle: après deux mois d'apoplexie et d'un traitement intérieur sans aucun effet; on procéda à l'ablation des bords de l'ulcère, par une incision circulaire: une large portion de l'os frontal resta découverte; pour en accélérer la cicatrisation, on appliqua la suppurée, suivant l'ingénieur M. de Brette (B). Pendant les premiers jours qui suivirent l'opération



(A) traité complet de chirurgie observation 161.
(B) voyez Le chirurgien d'hôpital tome premier.

Le Malade donna l'opoir d'une prochaine guérison; mais ce jour même le devant
de la tête devint douloureux, et dans la nuit il délira.

Le 10^e La douleur augmenta, le Malade eut des frissons qui firent suivre d'une fièvre
violente; La chaleur de la peau, celle de la plaie qui étoit de la plaie firent
suspension que le Malade avoit presché contre le délire; [a] une saignée n'opposa
rien à l'accroissement des symptômes dans la nuit du 11. Les yeux s'enflammaient.
L'après-midi le matin vers le soir et à la fin du jour de la douleur; Le Malade
étoit dans son lit, la tête penchée en avant et appuyée sur ses genoux;
cette attitude lui étoit défavorable, qu'ayant exigé qu'il se couchât; il se mit sur
le ventre; après l'avoir quitté qu'un infirmier, qui ne l'avoit vu grandes, vint
indiquer qu'il se tenoit la première situation; on lui donna de l'eau d'ammoniac
pour l'opoir et il se saigna deux fois du pied; mais le délire survint dans la
nuit; et un léger saignement de nez parut avant la mort, arrivée le 11^e jour
à dix heures du matin.

Le 12 à l'ouverture de la tête qui fut faite supérieurement de plusieurs chirurgiens;
on trouva un amas de pus entre la frange et la dure mère, d'autant sous l'endroit
où étoit placé l'ulcère; ce pus qui étoit épais et fongueux, opprimoit le sinus
longitudinal supérieur, qui se formoit une fonction polypéuse de la membrane
et de l'écaille. Les sinus inférieurs qui se trouvoient ouverts par la section
secondaire de la boîte du crâne, étoient fermés par le pus, qui y étoit entré; le pus
perforatif ayant vu les premières tables du côté gauche.

Les trois observations précédentes prouvent évidemment, qu'un humeur extravasé
entre la frange et la dure mère, donne indépendamment son signe de la compression
du cerveau; des indications positives du lieu de l'épanchement, dans les symptômes
formés par le crâne; mais le cerveau n'étant point sensible, l'épanchement et
les dépôts qui se forment dans la substance, ne forment par ordinairement les
mêmes symptômes que ceux qui se trouvent à la surface, et particulièrement entre la
frange et la dure mère; La très grande quantité de pus nommée morte pûr que
subitement, Long-temps après des frictions de frictions de la tête; et les corps
étrangers qui ont été, même plusieurs années dans la substance du cerveau (B)
et ensuite favorer une mort prompte; ne prouvent que trop cette affligeante vérité;
quelques fois cependant les crânes ont prouvé par des aides capables de nous
déterminer, non seulement la situation du dépôt; mais même les limites de la
substance du cerveau, (C) et d'ailleurs par des extrêmes, on pourroit avoir quelque
semblance du lieu du dépôt ou de l'épanchement: Je vais rapporter quelques
observations, qui pourroient dans certaines circonstances aider à déterminer le lieu
du dépôt.

5^e observation un enfant de cette ville avoit paru très sain et bien constitué jusqu'à l'âge de
trois ans, quand de ses parents s'aperçut qu'il ne voyoit presque plus de l'œil gauche,
quoiqu'il n'eût aucun vice apparent: quelque temps après il y vint
un peu de rougeur, qui se dissipa par le repos, et qu'on négligea: La fièvre

[a] ou bien pour un effet de l'indigestion La situation que le Malade donnoit à sa tête, en
l'appuyant sur ses genoux.

(B) Mémoires de l'Académie Royale de Chirurgie, Remarque de M. Quernay sur le
plaie du cerveau, tome deux de l'édition en 12 page 131 et suivantes.

(C) ibidem sur les observations qu'on s'est pratiquées au cerveau page 138 et suivantes.

Le sein avec les symptômes précurseurs de la peste vérolé; il eut en effet; mais
 L'éruption se fit mal, il n'eut qu'environ une trentaine de boutons; tout s'enflamma,
 on y eut peu d'égards; on s'en fut que cela finirait avec la peste vérolé; cependant la tumeur
 de l'excitation de la peste vérolé s'aggrava, et l'ophtalmie continuait et venant de
 l'intensité; on appella du secours: Les saignées, les purgations, les lavages, les
 sollicités différemment exécutés, ne purent s'opposer à la formation d'une tumeur qui,
 on s'en fut de tenir de voir l'homme; alors l'œil parut sans espoir; tout étoit
 gonflé, on ne voyoit plus qu'une excroissance de chair; le Malade avoit
 parfois de vives douleurs de tête insupportables; il en eut une fois de si violente, qu'il se
 porta de son orbite; depuis cette éruption, chaque jour il augmentoit de volume;
 Voyant qu'il n'avoit d'autant d'espoir que dans l'expectation; on la fit au niveau
 des paupières. Le Malade se trouva beaucoup mieux après l'opération; il ne
 souffroit presque plus; les horreurs des tumeurs en fait étoit pendant environ deux mois;
 on avoit d'une excroissance de la voir guérir; mais au bout de ce temps, le petit
 Malade commença à se sentir de nouvelles douleurs; et d'aussi la persévérant
 qu'il se levait de milieu de la peste plaie une excroissance fongueuse, en proie à
 l'ulcération, qui ne le voyoit plus qu'à l'ordure; celui-ci voyant que les
 douleurs et le fongue se renouaient chaque jour de l'excroissance; lui fit suspendre
 intérieurement, tous les jours les plus vantes, pour s'opposer au fongue; mais
 ce fut à vain d'effort; les champignons étoient toujours de la propagation rapide;
 il se levait de la surface de l'immense Ampoule de venter variqueux, qui
 donnaient quelques fois beaucoup de sang; et on devoit une saignée d'une odeur
 insupportable; et d'ordres de plus avec beaucoup de gémissements, insupportables
 parfaitement la figure d'un chou fleuri: il couvrait toute la joue, ainsi
 que le nez qui en étoit déformé; la bouche étoit ouverte à moitié: il
 étoit de l'expectation jusqu'à la racine de la langue; extérieurement
 jusqu'à l'œil, inférieurement au niveau de la base de la mâchoire inférieure,
 et faisoit beaucoup de saillie d'un côté et de l'autre; il avoit seize à dix sept
 trous de perforation, lequel présentait un aspect horrible.

Le fut dans cet état, et environ deux ans après le commencement de cette Maladie,
 qu'une personne de mes amis me pria d'apprendre son dessein de se faire; à quoi je
 ne consentis que par complaisance; j'en fis un prognostique fâcheux, et j'appelai
 en consultation quatre de mes confrères; nous fûmes tous de la nécessité de
 l'expectation par la ligature, que j'exécutai sur le champ le 10. 9. 1764.
 quelques heures après, j'appliquai à la nuque un large emplâtre vésicatoire,
 qui indépendamment de la suppuration qu'il a fournie d'écoulements; lui fit
 rendre pendant plusieurs jours, une grande quantité d'urine trouble et fort épaisse.
 Je serrai tous les jours la ligature, et à chaque fois le Malade souffroit
 pendant environ deux heures après quoi il s'endormoit.

Le 18. jour les champignons tombèrent suspendus à la ligature; le nerf optique lui
 étoit de redoublé, et pouvoit avoir donné naissance au cancer. L'orbite étoit
 toute entièrement vide; les paupières supérieures et inférieures étoient
 enfoncées, et étoient presque tout à fait corues, et décolorées, par la persévérance de
 la tumeur, et le contact de la matière très âcre, qu'elle avoit rendue depuis
 son commencement.



Les Premiers jours je remplissois L'orbite de harpie & de he et mollette: Les fluxes ne pullulant point et La Supuration estoit d'elle et peu abondante; j'ajoutai du Pompholyx et sus la fin un peu de Gros vin. J'entreteins La Supuration des Vespéritaires pendant près d'un mois, ensuite je leur substituai un fauteur à la nuque; Je purgeois mon Malade tous les 7 ou 8 jours avec les pillules de Bellote, et lui faisois prendre tous les jours deux Plumes d'autimoine faud, qui entretenoient La Liberté du Ventre, et pour ôter ou une tiraille de l'oreille et de l'oculaire.

Le 30 decembre La fièvre parut solide, ce qui me dormoit beaucoup de bon fauor; fau avertissement du 27 novembre que le fongus tomba, le Malade avoit été de mieux en mieux; il ne se plaignoit plus de douleurs, dormoit régulièrement toute la nuit sans sursaut, et se mouvoit à l'aise et avoit de nouveau ses forces et pria de l'embouppoint; mais cette joye fut courte, car le 31 janvier mon malade se plaignit d'une Douleur au dessus de l'oreille, il eut un peu de fièvre, perdit l'appétit, et d'ailleurs parut chargé, et ne dormit point dans la nuit. Le 1^{er} fev. eut point de fièvre, mais il se sentit un mal à l'air général; il étoit impatient inquiet et de mauvaise humeur; en vintant l'orbite j'appercus dans le fond une petite élévation jaunâtre, grosse comme un petit grain de gros sel, qui étoit fort sensible.

Dans la nuit du 5 au 6 le Malade eut de la fièvre accompagnée d'une violente Douleur à la partie antérieure de la tête, qui l'obligeoit de se couvrir sous une couverture; et lors qu'on le faisoit changer de situation; il revenoit aussitôt à porter la tête en avant et en bas: il fut saigné, mis à la diète; je Reappliquai des Vespéritaires de rière les oreilles, indépendamment du fauteur à la nuque, que j'avois pratiqué quelques jours auparavant: La petite tumeur du fond de l'orbite s'éleva; La fièvre et les douleurs s'acrerent; le Malade eut un évènement que je regardois comme fâcheux, en ce qu'il importoit les Douleurs d'un organe l'affoiblit.

Le 10^{me} jour d'anta environ 18 jours sans se plaindre d'autre douleur, que de quelques élancements, tantôt dans le fond de l'orbite, et tantôt au dessus de l'oreille; mais ces élancements ne duroient qu'un instant; toutes fois il avoit de temps à autres un mal à l'air général; Je l'achois par tous les moyens pour le faire le petit alaire de l'orbite, pendant que j'employois intérieurement les remèdes les plus capables de détourner l'humour et d'en faire l'évacuation: cependant quoy que mon Malade parut mieux; il souffroit toujours son penchant à porter la tête en avant et en bas; ce qui me faisoit sans son compte, une inquiétude que l'évènement me prouva n'être que trop d'un fond; car le 23 il eut de la fièvre et des Vomissements, de douleurs à la partie antérieure de la tête, et principalement dans le fond de l'orbite de l'œil extérieurement; et se plaignit aussi d'un point de l'œil ou d'un point de l'œil droit, ce qui, joint à la situation d'anta qu'il dormoit machinalement à la tête, me faisoit craindre une inflammation à la dure mere, ou aux Lobes antérieurs du cerveau.

Le 24 le Malade tomba dans l'assoupissement, La fièvre ayant augmenté, il ne se plaignit plus d'aucune douleur; il ne fit plus que de gémir quelques mots; il eut des mouvements convulsifs, toutes les oreilles se suppurèrent. Le 25 le Malade parut se calmer; mais le 26 il tomba dans l'assoupissement et le 28 il mourut. La parole; alors toutes les situations lui devinrent indifférentes, et étoient dans l'œil ou on le mettoit. Rien ne put être de son assoupissement qui dura

En qu'on s'efforçait qu'il mourût. Les Vessies & l'ouverture de la tige supposée
 Desp. l'urine & l'urine: je trouvai toute la substance de la vessie très molle sans
 l'ouverture et abîmée de beaucoup de seronites: les Ventricules Supérieurs
 prodigieusement dilatés, contenant beaucoup d'eau: les corps famelés & mâtés,
 Les Ventricules des nerfs optiques & les nerfs eux-mêmes molles, noyées, & d'une grosseur
 exorbitée, particulièrement de celle de l'œil catopé: le plexus choroidé étoit
 noir et fœide.

La supposition qu'avoit cet enfant asortie l'artère endurée et qu'il étoit allé
 par un effet mécanique de l'engorgement inflammatoire des queues de nerfs
 optiques & des corps famelés, lequel engorgement augmentant le volume des parties,
 Les uns à la gêne, les opprimoit, en troubloit les fonctions et sollicitoit le Malade
 à chercher une situation tendante à alléger le porteur affligé: l'expérience et
 le raisonnement paroissent d'accord sur ce point.

Cette observation nous fait encore voir que les ophtalmies aux quelles les enfans
 sont sujets, peuvent avoir de dangereuses suites, lorsqu'elles sont négligées sans
 leur soulagement, ou qu'on n'emploie pour les combattre que des secours impuissans,
 tels sont d'insouffrance, les saignées, les purgations, les collires de différentes peaux, les
 Bain de pieds et les Vésicatoires: sans un fluide ancien et débile, ou les
 vaisseaux obstrués sont trop faibles pour résister aux liqueurs qu'ils
 contiennent, ou ont toujours grand besoin de stimulation et un nouvel influx, inattendu
 des aides, dont des taches insaisissables de la forme transparente, sont les premiers
 qu'il en résulte. Dans ces cas il est de nécessité indispensable, de déplacer
 l'humour par un régent, pratiqué par de l'indurité affligée: on ne voit point de
 aujourd'hui proposer les autres actuels, avec lequel les anciens opéroient des succès
 merveilleux suffirent pas; mais un moyen trop négligé, qu'on s'est substitué
 avec avantage, et dont l'appareil est moins effrayant, est la trame d'opie
 d'attente, fournie par de la Balle (a) et appliquée en frottant de l'huile de
 menthe. M. Auffray mon oncle, l'a expérimenté dernièrement, avec les plus
 grands succès, dans une occasion, où l'œil paroît sans espoir, après avoir
 employé inutilement, les Remèdes les plus accrédités pour cette fâcheuse
 Maladie.

Voici nous avec observations qui indiquent le lieu de l'ophtalmie, le
 timbre de quelque autre.

Observation



On lit dans l'œuvre (b) une observation d'ophtalmie, qui est quinquante d'aron
 ayant demeuré long-temps étourdi et endormi; ne faisoit rien de remarquable, ni ne
 demandoit aucun aliment, ne les prenant même qu'avec peine, lorsqu'on lui mettoit
 dans la bouche; ne s'efforçoit que lorsqu'il étoit éveillé, mais étoit toujours
 à table appuyé sur sa main, ayant les yeux fermés et étoit dormi, et si
 étoit interrogé et souvent avoué, et ne répondoit que très peu de mots, tous
 contraires à la demande; que lui ayant ouvert les yeux après la mort, on trouva
 dans les yeux une grosse glande dure, engendrée sur les corps fallus, qui
 paroît avoir été formée par un fœtus qu'il avoit reçu à la tête, long-temps
 avant le commencement de son mal.

Les symptômes occasionnés par la supposition de cette glande sur les corps fallus
 (a) Voyez les chirurgiens, l'hôpital tome deux page 283 et suiv. ant.

(b) Pratique de Médecine tome 6. page 304 et 31.

ont quelque Ressemblance avec le coup d'oblique qui fait le sujet de la belle observation de M. de la Perrière sur le sieur de Laine.

7. observation

un jeune homme dit d'Almuth (a) fut de l'opé au côté gauche de l'occipital, on fit une fente assez considérable avec enfoncement. L'inquiétude qui s'élevait de la dure mère; et une autre ouïe qui ne fut découverte qu'après la mort. La première venoit de la déchirure, et celle qui étoit cachée de la fracture après le coup de la dure mère point d'endroit de la seconde fracture; il paroit cependant que c'étoit à la partie antérieure de la tête, par la Malade étoit d'insupportable au dessus du nez; et tandis qu'on faisoit la section du crâne, et sortit quantité de pus par les narines.

8. observation

Le même rapporte qu'un homme qui avoit été de l'opé à l'insensibilité par un instrument piquant; qui avoit ôté la dure mère, qui en étoit offensée; c'est une paralysie du côté opposé, l'ouverture à la partie offensée et qui avoit desorté principalement, une pesanteur horrible autour de l'œil de la partie affectée. L'homme étant mort, on ouvrit le crâne, et on trouva entre les membranes et le cerveau une livre de pus.

Il pourroit peut être m'objecter qu'au sein de la Malade qui font le sujet de nos quatre premières observations; l'épanchement étoit trouvé placé immédiatement sous l'endroit du crâne qui avoit reçu le coup; on ne peut en conclure que le signe qui s'est élevé à l'indiquer l'épanchement en cet endroit; peut servir à faire connaître le lieu précis d'un autre coup, qui se les souvant, se trouve très éloigné de celui qui a été frappé: à cela je réponds, que si l'épanchement est et non la fracture du crâne, qui fait le danger de la plaie de tête; et qui se trouve quelquefois des fractures sans épanchement sensible, et des épanchements sans fracture; et que s'il importe aux gens de l'art, de connaître le lieu d'un autre coup, soit que le plus souvent et est accompagné d'un épanchement mortel: ce le signe tiré de la situation que prennent souvent les Malades, en se penchant et se frottant de l'opé l'épanchement même; peut être regardé comme un pathognomonique de lieu de l'épanchement, puisqu'il indique également, celui qui vient de l'aine interne, et celui qui est le résultat d'une lésion des aires ou du crâne: par enfoncement ainsément, qu'un homme qui avoit reçu à l'occipital un coup dont l'effet se seroit transmis à l'opposite; l'épanchement faisant le même sonder; y donneroit la marque de la prise par la même d'impression, qu'il est éprouvé le coup qui ont reçu le coup en cet endroit; soit à dont les deux dernières observations nous font voir la preuve.

Par quoy que l'épanchement, se trouve dans l'aine au dessus de la clavicule ou à l'opposite de l'aine, et dans l'autre, au dessus de l'orbite; ils avoient été frappés à des endroits très éloignés de l'aine ou se trouvoient le dépôt; et ne laissent par d'insupportable les effets, par le sentiment d'oppression dont ils se plaindroient à l'un et l'autre.

D'après ce que l'on vient de voir, on ne peut qu'être étonné, que la femme dont M. Gauraud a fait trois lésions à l'académie, le vicillard dont parle

(a) Bibliothèque chirurgicale de Bonnet Tome quatre fontaine finq page 201. 202 ibidem page 202 et 203.

M. Morgagni, et Leblais, auquel amateur Lévassier appliqua le trepan a la partie opposée a la blephare (a) n'ayant éprouvé le même signe, qui denote l'effroy de l'épanchement; ce qui auroit été une indication suffisante pour le trepan: mais ce signe n'étoit point connu; aucun auteur qui se sache n'en fait mention: il paroitra sans doute étonnant, qu'un symptôme qui se soit offert si souvent aux yeux des observateurs; surtout dans les épanchemens et les Despotas foveux; leur ait échappé; il y a bien de l'apparence, qu'un de ces hommes de beaucoup d'autres; on n'aura cherché qu'un des Livres, ce qu'on ne pouvoit trouver qu'en observant la nature, la simplicité de la chose, pourroit bien en avoir été une des principales causes; car on voit qu'il n'y a que les épanchemens dans les foveux coronales, qui puissent conduire a cette espèce de découverte; et dans ce cas, on aura pu pour un effet de mal être et de amitié de Leblais, les mouvements qu'ils se donnaient, pour se mettre dans une situation, telle que les os supportent le poids de l'humour épanché; car dans un épanchement sous le front ou l'occipital, le Malade couche sur le dos, ou sur l'un des côtés; paroît être dans une situation naturelle; ce n'est donc que par son attention particulière, que l'on peut s'apercevoir s'il y a un épanchement. Sur ce os. pour cela il faut interroger le Malade ou ceux qui vivent avec lui, et tâcher de savoir sur quel côté il est habitué de se coucher; s'il n'est pas a portée de prendre ces informations; il faut examiner la situation, se faire mettre a plusieurs fois sur le dos ou sur l'autre côté; et si devient toujours a la première position; on pourra être averti, d'être de tous les autres indices qu'on pourra recueillir, tels que l'application directe du main du malade a un même endroit, la paralysie du côté opposé, les mouvements involontaires de l'autre; l'impulsion des yeux et du nez; on pourra s'en être averti qu'il y a épanchement de ce côté: j'ay vu un blephare dont l'abaissement augmentoit, et qui avoit des saillies, lors qu'on le mettoit sur le côté opposé a l'épanchement, mais le tout a l'observation.

II.

9^e observation

Guillaume LeDian, matelot du département de St. Malo, âgé de 50 ans, d'un tempérament mélancolique; souffrant au mois de juin dernier (1768) une Douleur a la partie supérieure moyenne du parietal gauche; en quinze jours de temps, il lui vint en cet endroit un dépôt de la grosseur d'un œuf de poule: il ignoroit a volonte la cause de cette tumeur, ne se souvenant point s'en être auparavant aucun soupçon en cet endroit. Son insensibilité lui fit d'abord négliger la chose sans considération; et ce ne fut que dans la fin de son Volume, qu'il consulta son cousin de sa part un chirurgien de son village, après quoi de l'avoir avec une lancette: il n'en sortit qu'un sang, a bout de quelques jours le Malade se sentant guéri il fut envoyé de lever au port de Brest, pour embarquer sur le vaisseau du Roy; il n'en fut pas long temps sans éprouver les mêmes douleurs, et la tumeur reparoisant de nouveau; il vint le 17^e 8^e a l'hôpital Royal de la marine: on appliqua sur (a) - Fin des Croniques a la séance de l'Académie Royale d'histoire en 1766. -

La tumeur de l'ischio-fémoral, et on lui fit prendre intérieurement les autres corbatiques, soupçonnant que cette Maladie étoit le produit d'un Vice scorbutique; toutes ces Douleurs étoient vacillantes dans leur abjection; quoiqu'il en fût ainsi, les généraux furent en bon état, et qu'il n'eût d'ailleurs aucun autre symptôme de cette Maladie: par ces secours la tumeur s'affaissa peu à peu, et se dissipa entièrement, soit par transpiration, des urines, et peut-être par la petite vérole de L'incision; mais d'autr qui y parut d'ouverture venibles; quoiqu'il en soit de cette espèce de Résolution; La douleur Long se diminua, après on traça par de L'intensité et l'est étoit jusqu'à la suture sagittale, et vers la partie postérieure du péricrète. Le Malade dormoit très peu et avoit le sommeil très le par ses Nervs inquiétans.

Au commencement de novembre le Malade a senti la force beaucoup diminuée; il ne pouvoit lever Long-tune de bout; au pit-est qu'il étoit levé, il sentoit alors la base de la tumeur, un poids qui le comprimoit, se tournoit; lui faisoit des ébrouissements de vertige; de tantement d'écouler, une douleur qui se portoit à la partie (au bout de l'apophyse) qu'il s'appuyoit à l'effet d'un fort et l'obligeoit à se remettre au lit, ou il ne pouvoit se lever ni sur l'un ni sur l'autre côté de la tête: la situation qu'il soutenoit le mieux et dans laquelle il se couchoit le moins, étoit d'être couché sur le dos, la tête un peu plus haute que la poitrine.

A cette époque le Malade s'aperçut qu'il avoit la vision de l'œil droit très affaiblie, seque se donnera à l'élargissement de l'apophyse; à quelque jour de là; il lui vint au bras du même côté une paralysie du mouvement d'extension, par lequel il se plaignoit de sentir d'une façon interne de l'humérus, un engourdissement et une douleur qui s'étendoient jusqu'au bout de doigt; et lorsqu'on le pinçoit il se sentoit comme à l'autre bras: dans le même temps se manifesta que la tête se portoit de gauche à droite par un mouvement saccadé qui se succédoit de minute en minute; et de petites mouvements saccadés pour lever dans les muscles du Levier: le pouce au bras paralysé, étoit appuyé de moitié plus faible que l'autre: le Malade étoit d'ailleurs hébété et dans un état de stupor.

Vingt jours s'écoulèrent sans qu'on changea rien à son traitement: la tumeur étant dissipée comme nous l'avons dit, et les autres symptômes prenant chaque jour de l'accroissement; le Malade fut mis aux saignées fabriques: le Médecin le fit saigner saignée, lui fit mettre de l'opiat à la nuque, le lendemain les chirurgiens aidés major lui en fit appliquer sur l'endroit de la tumeur, qui parut bleuer un peu: on lui donna l'émétique, qui le vena beaucoup, sans lui faire plus de douleurs; il parut au fontaine ~~un~~ on trouva mieux; par de la soir même, il se sentit de l'apoplexie, la tête étoit même pesante; et fut même un peu plus de facilité à mouvoir son bras, qu'il fut porté un peu plus haut; mais le mieux du bras ne fut pas de durée; et quoiqu'il se couchât moins de la tête depuis le vomitif; Je remarquai qu'il n'étoit presque toujours couché sur le côté Malade; et que lorsqu'il se mettait par devant sur l'autre côté; il ne pouvoit y rester Long-tune; il lui sembloit alors qu'un poids considérable pressait

Sur le côté d'am, et d'impulsoit d'icelles: j'attribuois la pénétration que le Malade avoit des ouvertures du côté malade; et l'effet de l'émétique, qui dans son opération avoit pu étendre le foyer, vers la partie inférieure d'apartat; par où depuis trois semaines je ne doutois point que le foyeau ne fût comprimé; soit par un dépôt interne, lequel on flement ou la force de l'air.

L'endroit de la tumeur s'élevant de nouveau, avec les mêmes accidens, le Malade fut remis au sang de l'opérateur; il commença à s'aplanir d'un côté et d'un autre. Longtemps s'écouloit la tumeur. Le 3^e febr. le Malade eut une douleur avec un gonflement d'icelles, et d'apartat. Martou de la même sorte; on fear qu'il formeroit un dépôt; mais il disparut avec un écoulement aqueux pour.

Le 5^e le Malade eut une fièvre violente avec un grand accablement. La tumeur faisant des progrès, on découvrit un foyer de suppuration, et la partie supérieure moyenne d'apartat, qui se fit sous par la petite fistule de l'incision faite à Dinan. Le moment de cette ouverture, les accidens de la compression diminuerent.

Le 11^e febr. on fit sur la tumeur une incision en X. et on découvrit que l'on étoit parvenu à la membrane et à la tumeur d'apartat qui n'avoit que la fourchette du ligament; La première table étoit unie et séparée par la force; La seconde étoit détachée de la grande d'un peu de l'air, vacillante sur l'air interne, et ne tenoit alors principal que par quelque lambeau, que l'on souleva avec le forceps. L'air interne que l'on trouva d'air, ne fut point incisé.

Du 11 au 12 et suivit alors la salotte aponeurotique un simple ordonnance qui, les jours suivans gagna toute la face, et fit braver la gangrène d'apartat; mais l'ouverture d'icelles se forma d'icelles, qui se forma au bord inférieur de l'orbite du côté malade, terminée par un écoulement, que l'on combattit d'icelles par les cataplasmes anodins et desolutifs, et les fomentations de même genre: le Malade ayant eu même l'air un écoulement; on lui a fait prendre avec l'air le quinquina allié au sucre, qui lui a procuré une transpiration salutaire.

J'ay dit plus haut que la petite ouverture qui se fit naturellement, avoit apporté de la diminution d'air les symptômes de la compression d'icelles; mais ils s'évanouirent entièrement, lors que l'on fit d'icelles, et le Malade ne sentit plus d'autre douleur, que celle que lui faisoit la tension de la peau, par l'incision et au moment de la ponction. Les premiers jours la suppuration étoit glorieuse, mais l'écoulement de la tumeur n'étant détaché le 11^e jour de l'opération; l'écoulement de la tumeur étoit de mieux en mieux.

Les 25 et 26 febr. on trouva sur la tumeur une apoplexie d'icelles, avec une suppuration de la tumeur, qui donna quelque inquiétude; mais le 27 on découvrit une tumeur qui s'élevait de la tumeur jusqu'à l'apartat Martou; on fit en cet endroit une petite ouverture, qui laissa s'écouler la suppuration. Depuis ce temps la tumeur a beaucoup diminué; et il n'y a plus, aujourd'hui, de tumeur; qu'un point de la tumeur de l'air, qui s'écoulera de l'entree de la tumeur. (u)

(u) Le Malade a été vu par un grand nombre d'opérateurs, et particulièrement par M. Buret, qui a été chargé de la ponction.

- 1^o Lorsque La tumeur paraît se résoudre, le Malade desmonte les symptômes de la compression du cerveau; Le sang qu'elle renfermoit se pousse long-temps, s'étant décomposé et devenu visqueux, aura peu après été absorbé, d'où la tumeur externe disparaît; La matière purulente aura bientôt détaché l'intérieur, et fût alors que Le cerveau aura desmonté les effets de la compression.
- 2^o Le Malade ne pouvoit s'asseoir debout, parce que dans cette situation, la gravitation du d'humeur, se faisoit précisément sur l'endroit de la tumeur et vaillant sur la dure mère; au lieu qu'étant couché sur le dos, dans la situation que nous avons dit; l'effort de la pression étoit partagé entre le cerveau et la partie la plus délicate du foye, ou la matière trouvoit moins de résistance que du côté du cerveau, qui par là se trouvoit moins comprimé.
- 3^o Le Malade se frottoit sur le côté de la tumeur, parce que la matière s'étoit effectivement portée de ce côté là, comme on la vit par le gonflement pâteux qui se forma d'un côté de la tumeur, quelques jours avant l'ouverture de la tumeur; et par le sinus que l'on trouva ouvert sur l'apophyse mastoïde.
- 4^o Le Malade après n'avoit point de mal de tête; cependant il est difficile de croire qu'il n'ait par eu quelques faibles étourdissements; Si l'on fait attention que dans ce cas-ci, on porte les plus grands fardeaux sur la tête; et si l'on se rappelle que la chute d'une pierre (a) sur cette partie, a causé une plaie considérable; et qu'une chute de la hauteur d'un cheval en descendant d'un cheval, (b) a occasionné une excoriation de la dure mère, qui a causé la mort de la Dame dont parle la note (b).

10^e observation. L'observation dont M. Leblanc, chirurgien, s'en mérite d'être distingué; est en même temps d'auteur et de sujet; est trop belle et trop conforme à mon objet, pour que je n'en fasse par image dans ce mémoire. Le témoignage d'un si habile homme, étoit tout capable d'inspirer la confiance; et il nous est d'autant plus précieux et moins suspect; qu'il a rapporté lui-même, les premiers symptômes qu'il a vus. (c)

L'auteur regardant préjudicialement aux effets d'un monde dans lequel on voit d'or d'argent fondre, après un or geyser d'acier et un blancher à seller que l'on voit dans les expériences électriques; L'explosion de son geyser, lui fit représenter l'effet d'une commotion électrique, dont le plus grand ébranlement se fit sentir dans l'intérieur de la tête, qui resta pesante et douloureuse jusqu'au huitième jour, que Le Docteur s'aperçut aussitôt qu'il lui sembloit que les os du crâne se détachent. La fièvre et tous les symptômes d'une violente inflammation; lui firent éprouver les plus fâcheux tourmens, sans que les saignées ou avant de peler, du crâne, du pégus, de la jugulaire et de l'artère temporale, y apportassent aucun soulagement: il eut des contractions, des hoquets, des vomissements involontaires.

(a) Collection de Thèse de M. le Baron de Haller 3^e deputation par M. Levoysier Tome Premier

(b) Traité des plaies de chirurgie observation 180.

(c) Journal de Médecine Le mois de novembre 1762.

Dans tous les membres, des soubresauts dans les tendons des muscles fléchisseurs
 Et extenseurs du poignet (Probablement du côté Malade) Les pulsations des artères
 et des tendons dans les tendons jusqu'à la fin de la Maladie. il sentoit un poids énorme,
 Dans l'intérieur de la tête, près de la suture Sagittale du côté gauche; Le cuir
 chevelu devoit s'enflammer.

Du 15^e au 30 les accidents s'aggravèrent peu à peu; mais cependant point de fièvre pour
 qu'il put goûter les douceurs du sommeil; La tête étoit toujours d'une pesanteur,
 et surtout du côté gauche. quand on le mettoit dans son fauteuil, le poids de la tête
 le faisoit pencher et l'introuvoit de repos.

Du 30 au 56^e jours les accidents augmentèrent peu à peu; les douleurs et les
 contractions devinrent plus violentes; il lui sembloit qu'une pierre pesante étoit
 sous le crâne, s'écartoit les sutures avec force; il sentoit un écoulement ou
 déchirement intérieur, depuis la suture Sagittale, jusqu'à l'oreille de même
 côté; Le siège de la douleur indiquoit celui du foyer, qui étoit entre les parietal
 gauche et la dure mère; le Malade demandoit le trépan, pour donner issue
 à la matière; mais avant de se soumettre, il désira voir le célèbre M. Lefat
 son ami qui s'informa de son état, par la poste pour le lui dire
 par M. Leblanc.

une heure avant l'arrivée de M. Lefat, M. Leblanc s'endormit pour la
 première fois, pendant une demi-heure. à son réveil il trouva son soupin
 mouillé de sueur, qui sortoit de l'oreille gauche, s'en fit continuer comme d'une
 source, ce qui le soulagea beaucoup; cette heureuse circonstance fit décider à l'opération
 du trépan, et au bout de deux jours M. Lefat repartit pour Rouen.

M. Leblanc estime qu'il n'aurait pu vivre les 15 à 16 premiers jours de son
 écoulement, environ sept onces et demie de pus d'une bonne qualité.

Le 10^e jour de l'écoulement, ou le 66^e de la Maladie M. Leblanc sentit dans
 l'intérieur de la tête vers la suture Sagittale; à l'intérieur des téguments de la scalp
 un mouvement douloureux; il lui sembloit qu'une liqueur passoit du côté gauche
 au côté droit; quelques jours après, les douleurs se firent sentir sous les parietal droit,
 et s'étendirent jusqu'à l'oreille. au bout de 20 jours le pus s'écoula par l'oreille,
 et le sommeil qui avoit été interrompu devint. Dans le même temps on sentoit
 la tête; et sous les parietal gauche, une espèce d'ondulation, semblable
 à celle que l'on remarque lorsqu'on secoue une phiole avec deux tiers d'eau
 d'huile.

Le Malade eut aux oreilles un bourdonnement et un fort, qu'il lui sembloit qu'un
 torrent passoit dans la tête: du 60 au 90^e jours les douleurs grandirent et lui firent
 impression; et sur la fin il remarqua que le volume de la tête, étoit accru
 de quinze lignes en circumference; ce qu'il attribua à la levation des parietaux,
 du gauche et de la droite un peu plus que le droit. M. Leblanc a peur que malgré
 l'opération et la fin de la Maladie l'écoulement n'ait été, et toujours source de
 jugement et la mémoire; mais il a été environ dix huit mois à recouvrer
 sa première santé; par l'écoulement de la tête, l'écoulement de pus par
 les oreilles, l'enflure de la tête et les grimaces se renouvelèrent souvent.



L'apoplexie in Voiture, diminua bien ces accidens, mais elle n'eut pu les
Dissiper tout a fait.

un Homme de fort bon car, qui avoit été précédé de mal aise et de douleurs de tête, lui survint
dans une nuit une pesanteur douloureuse d'estomach, qui fut suivie d'un
Vomissement de matières purulentes, d'une quantité extrême, qui lui parurent
venir d'estomach. Dans les efforts qu'il fit pour vomir, il sentoit le puer
descendre de son nez par le nez et par la nuque.

Depuis ce vomissement, M. le Blanc n'a senti aucun de ces accidens, depuis qu'il
il avoit été sujet jusqu'à lors, et sa santé s'est parfaitement établie.

Il est aisé d'apercevoir que l'apoplexie est de la même nature de la Maladie de M. le Blanc,
ont beaucoup de rapport avec ceux qui se sont le Malade qui fait le sujet de notre
neuvième observation. Je ne les rappellerai point dans la crainte de me répéter.

11. observation

On trouve dans ce petit Traité une observation qui s'est trouvée plain ici; il est
pag. 256 qu'une Brebis qui mourut d'un Vertige, et a laquelle on trouva au côté
Droit de l'occiput, sous l'apophyse, une Vésicle semblable à celle de poisson,
Remplie d'eau et de petits vers comme ceux qui s'engendrent dans le fromage,
Plus grosse qu'un œuf de poule et qui étoit imitée dans la substance du
cerveau, qui s'ouvrirent impu le troisième Ventricle: cette Brebis au
cinq jours de sa mort, et mourut tout le jour de sa mort d'un côté droit.

Il y a bien de l'apparence que si les Bergers eussent fait attention plutôt à cette
Brebis, et l'auroient vu plusieurs jours avant sa mort s'écrouler d'un côté
Droit. L'auteur rapporte d'autres exemples de semblables Vésicles trouvées sur
des hommes; mais il ne fait point mention de ceux qu'ils ont occasionnés.
L'observation suivante, qui est plus détaillée, nous fait voir d'historie d'une
Maladie semblable.

12. observation.

un enfant de 6 ans fut attaqué subitement d'une douleur au côté gauche de la tête,
avec apoplexie, la parole, un délire et des accès de vomir, son visage étoit
quelque fois enflammé, et d'autres fois il étoit pâle et décoloré; cette Maladie
fut regardée comme dépendante de vers, et le Malade traité en conséquence: Le 7.
jour la fièvre et la douleur augmentèrent, et se soutinrent avec plus d'ardeur dans le même
état jusqu'au 7. que le pouls parut plus faible que dans l'état naturel; mais
l'apoplexie devint lethargique. Le 10. jour le visage étoit très rouge et
douloureux et le pouls petit et faible on fit des scarifications à l'endroit où le Malade
étoit plaint de douleur, et on lui portoit la main lorsqu'il ne pouvoit parler.
Les scarifications rendirent l'expiration plus libre, et dissipèrent la douleur du
visage, mais sans produire d'autre effet. Le 11. il eut des trépidations, le pouls
devint intermittent, et le 12. il mourut. pendant tout le cours de la Maladie, les paupières
furent très rouges et parurent gonflées.

A l'ouverture de la tête, on trouva sous le pariétal gauche, une tumeur ou hématoïde
de la grosseur d'une noix, molle remplie de matière sanguinolente, et de petits
corps blancs, semblables à des petits vers: on trouva le long du sinus longitudinal
supérieur plusieurs autres petites tumeurs de même espèce que la première et qui
soutenoient aussi de la matière et des corps blancs. L'auteur croit que ces tumeurs
étoient le résultat d'une inflammation, toutes les veines du cerveau étant fort

(a) amenées à l'opération.

Fort enorgé, sa pie mere épaisse en quelques endroits, et se tendre par beaucoup
De son côté, ainsi que la Ventrécule; les deux phorides étoit des Squirreux, et
garnis d'un grand nombre de petites tumeurs. Les autres papilles n'offrant
D'aucun intérêt, qu'une invagination de la peau en deux endroits. (a)
L'auteur ne nous dit point quelle Situation prenoit son malade, mais il est
certain qu'il indiquoit l'endroit de son mal en effleurant la main.

Voilà ce que j'ai pu découvrir d'un des épanchemens Logés sous le pariétal et
Les tumeurs; mais avant de passer à l'examen des Symptômes de l'épanchement
Dans la fosse occipitale; ne puis-je pas établir, qu'une douleur violente et continue
Dans un point fixe de la tête, qui auroit résisté à tous les autres secours, même
L'incision jusqu'à l'os propre par M. Pouteau (b) seroit une indication
Suffisante pour y appliquer le trépan, qui a été pratiqué avec succès en pareil cas,
Sur une personne de l'illustre famille des chevaliers, (c) et Sur celle qui fait le sujet
De la neuvième dissertation d'observation de Thém. Leclerc de Baron de Halle. (d)

On trouve dans la mort (e) qu'une Dame qui avoit un violent mal de tête, ne put avoir
un seul quart d'heure de repos pendant neuf mois; que le seul calme qu'elle put
procurer, dépendoit de la compression qu'une personne très forte, faisoit en appuyant
Sur le pariétal gauche, la main dans toute son étendue: cette Dame étant
morte, on trouva sous le pariétal gauche, un corps étranger, d'une forme molle qui
étoit attaché à la surface de la dure mere, de la grosseur d'un œuf de dinde, et de
La figure d'une Morille.

Le soulagement momentané que procuroit la compression de la main, donne lieu
De penser, que ce corps étoit les sutures, et que l'application du trépan, auroit
pu sauver la vie à cette Dame; & ce Malade ayant beaucoup de rapport avec
celui que j'ai vu de si près.

III.

13^e observation

M. Phamilton Chirurgien, gradué à Lion (f) fut appelé en octobre 1747 pour
Voir un enfant de neuf ans, qui étoit tombé à la naissance, dans un malin,
et étoit fait une fontaine simple à la partie moyenne Supérieure de la fosse occipitale,
qui fut suivie d'un saignement de nez et d'impuissance de son urine qui dura
qu'un moment: M. Phamilton fit deux saignées, mais sur la fontaine de
Résultats, et au bout de quelques jours, le Malade devint à son premier
état; mais le 22^e jour de sa chute il fut appelé: il lui trouva une fièvre
fièvre qui avoit été précédée d'impuissance; elle se saignoit d'une violence
Douleur à toute la tête, principalement à l'endroit qui avoit porté l'os
La chute; il y avoit un gonflement érysipélateux, et le Malade
Souffroit moins de la tête étoit penché en arrière; les douleurs
étoient continues, et étoient. Jusqu'à ce qu'il fut appelé et l'enfant avoit des vomissemens
Les topiques anodins, l'acide, les saignées répétées, les bains, le pied et tout

(a) épanch. de Wimbouy tome trois article 44^{me} observation de M. Pouteau.

(b) Mélanges de chirurgie

(c) Bonnet d'histoire de chirurgie tome 2. chapitre trois Page 305 et 306.

(d) tome premier

(e) traité complet de chirurgie tome premier observation 180.

(f) Mélanges de chirurgie de M. Pouteau Page 438. 39 et suivantes

jugulaire, furent employés sans succès; ce qui fit penser à d'autres qu'il
pouvoit bien y avoir un épanchement: il demanda une consultation pour
laquelle il fut décidé, qu'on feroit préalablement vomir le Malade; ensemble
ayant paru faire quelque effet, on invita ses chirurgiens, qui parurent être
également favorables; mais peu d'instants après bravisser se renouvelèrent
et devinrent même périodiques, le Malade étant plus fatigué tout le
soir que le reste de la journée.

On fit une seconde consultation, où il fut résolu qu'on feroit une incision
en L sur le milieu de la partie Supérieure de l'osipital et on détacha le
Lambeau, qui se trouvoit sur la partie latérale droite du même os: Le
perioste se trouva douglâte fort étroitement adhérent au crâne, on ne
trouva aucune éruption.

Cette section procura quelque calme, que M. Pharnetton attribua au bien
de la vraisemblance à l'effusion de sang qu'elle avoit occasionnée; mais
le soulagement ne fut que passager, car le 3^e jour, l'enfant qui déignoît
parfaitement son mal, se plaignit d'un engourdissement dans le bras et
dans la jambe, il étoit assoupé. Les vomissements étoient plus fréquents,
et la fièvre qui continuoît redoublait toujours sur les 24 heures.

Ses amis nous obligèrent à faire une troisième consultation, dans laquelle il fut
arrêté que l'on trepaneroit. L'opération ne découvrit aucun épanchement sur
ladite mere, que l'on trouva fort tendue; et à laquelle on fit une incision,
qui procura la sortie d'environ une demi feuille d'eau douglâte;
L'opérateur porta le doigt dans l'ouverture, et eut une sûreté, qui fit
juger à tous les consultants que le cerveau étoit intéressé.

L'opération ne produisit aucun effet; Le troisième jour la paralysie succéda au
simple engourdissement du bras et de la jambe: peu de jours après l'enfant
tomba dans l'imbécillité; il survint une paralysie aux paupières, qui fut suivie
d'abolition de la vue; tous ces symptômes s'accroissant, le Malade mourut le
36^e jour de l'opération, et le 16^e de l'opération du trepan.

M. Pharnetton fit l'ouverture de la tête supérieurement d'un chirurgien et
Médecin consultants; La première chose qu'il découvrit, fut ladite mere qu'il
trouva épaisse et blanchâtre sur le dessus de la tête: La partie inférieure de
lobes postérieurs du cerveau étoit squarreuse; il fit dans cet endroit du cerveau
une incision profonde, sur chacun des lobes de ce cerveau: toute la substance
corticale, et une partie de la médullaire lui parurent endurcies: Les Ventricules
Supérieurs de même que le moyen, étoient plus pleins qu'à l'ordinaire, Pleins
d'un liquide douglâte: La tige du cerveau étoit plus dure et plus épaisse que
dans l'état naturel, surtout à la partie postérieure, L'ouverture du sinus
Longitudinal Supérieur découvrit une concretion lymphatique d'environ
quatre travers de doigt: Les Vaisseaux qui rampent sur la pie-mère étoient
fort engorgés. Il trouva sur la partie postérieure du cerveau, près le trou

occipital impu adroit, une tumeur en forme de champignon, de la grosseur
d'une châtaigne, pleine d'une substance blanche intérieure, d'une couleur blanche extérieure, et
situation à l'intérieur et découverte de la partie interne; La substance fortifiée
du foveolet étoit très dure; les fibres de la tumeur interne de la partie interne,
qui s'enfonçoient dans les sillons de cette substance, étoient garnies de petites
graines glanduleuses. La base de cette tumeur, étoit la même de la substance
fortifiée. Le commencement de la moelle épinière, étoit dur et saillant. Les
nerfs olfactifs de chaque et applatis, les optiques également durs et aplatis;
La glande pituitaire étoit dure et molle.

Les différents phénomènes qui ont été observés à l'ouverture de la tête de cet enfant,
paraissent être le résultat d'une inflammation, qui s'est terminée par
induration; on sait d'ailleurs que c'est le propre de l'inflammation d'épaissir
et de durcir les membranes. Le cerveau et le foveolet auront également souffert
de l'inflammation; toujours est-il certain que le 22^e jour de la chute, le
Malade souffroit moins, lorsqu'il penchoit la tête en arrière, et qu'il
désignoit parfaitement son mal; ce qui, joint aux anciens péripécies, étoit une
indication suffisante pour y appliquer le trépan, qui ne fut fait que dix huit
jours après: on sait combien le délai peut préjudicier au succès; mais les
signes qui nous indiquent le lieu de l'inflammation de la dure, et de
la compression, n'étoient point formés.

14^e observation.

L'observation de M. Morgagni, dans son ouvrage sur les Vésicules (a)
prouve d'une manière décisive la solidité de notre principe, La veine
un Laboureur de Bologne a qui un violent mal de tête et d'oreille du côté droit,
avoit fait une paralysie du côté opposé, eut une gangrène au dos, parce qu'il
ne pouvoit se coucher que sur cette partie. A l'ouverture de son corps,
on trouva environ deux onces de sang saillant épanché entre l'occipital et
la dure mère qui enveloppe le foveolet du côté droit. Cet épanchement
explique pour quoy le Malade ne pouvoit se coucher que sur le dos.

15^e observation.

On trouve dans le Dictionnaire (b) une observation de Bernard de Verville, si elle étoit
plus circonstanciée, pourroit beaucoup servir à confirmer les autres,
quoiqu'elle ne le soit pas. Le Vient de Verville, elle ne peut que faire naître des
conjectures; le vrai cependant la rapporte.
La servante d'un foyon de Strasbourg, étant montée sur une échelle pour
arranger du bois, donna en tombant, la tête contre un pilier de bois, qui
étoit au-dessus de l'échelle; on ne vit ni tumeur ni écoulement à la tête; elle demeura
étourdie quelques jours après la chute, mais elle revint bientôt à elle, parla
raisonnablement, prit de la nourriture: quelques jours après elle fut un esprit bon et
raisonnable, la tête étoit demeurée courbée en arrière: Le 11^e jour il lui
vint des frissons noirs qui l'empêchèrent.

L'étourdissement que le patient ressentit après la chute, étoit sans doute l'effet

(a) Diverses observations d'anatomie et de chirurgie Page 177. et sur autres.

(b) Bibliothèque chirurgicale Tome troisiéme Page 163.

De la commotion, et l'opistotonos particulièrement de la tête, celui d'un spasme anhérent
fourmillement dans les os occipitaux.

16^e observation.

Après avoir rapporté toutes les observations qui se sont présentées en faveur de
moi-même, je ne dois point en omettre une qui à la première lecture, semble

Les fontaines; elle est de M. Douglas chirurgien de Limbourg. (a)

un homme âgé de 19 ans fut attaqué d'immediats et d'importants symptômes
anterior de la tête, par lesquels il fut saisi profondément; on lui donna
l'émétique et des saignées; on lui appliqua le Vesicatoire de nonobstant
tout ce traitement, il étoit obligé de s'en tenir après la tête appuyée en devant,
autrement le malade se faisoit sentir beaucoup plus vivement; le sommeil
se sentoit être bon, il n'avoit point de convulsions; mais il étoit agité, —
dormoit mal, et lorsqu'il toumoit les yeux avec précipitation, il sentoit
des doubles et redouleurs.

Après avoir été trois mois dans cet état, le malade se passa tout à coup, un soir
au commencement de janvier 1737. et soupa avec une aide de chambre, fut un coup
de boire, à la suite de quoi il eut une hémorrhée. Le lendemain matin il
demanda du thé, et dans l'intervalle même il tomba dans une espèce
de faiblesse. on lui ouvrit la veine du bras, mais il ne sortit point de sang,
et dans deux minutes il mourut.

On lui ouvrit la tête, et on trouva deux os de la base du crâne déformés
dans une tumeur qui étoit formée au milieu du vertex, et une ouverture
au sinus longitudinal latéral gauche de la dure mère, par laquelle il
étoit échappé une grande quantité de sang.

Le soulagement qu'éprouvoit le malade, lorsque sa tête étoit appuyée
en devant, et l'augmentation de ses douleurs, lorsqu'il toumoit les yeux avec
précipitation; ne permettent guère de douter; qu'il y avoit dans le commencement
de la maladie, un engorgement inflammatoire aux lobes antérieurs du cerveau,
et que la suppuration du vertex, s'étoit faite par accident.

Je terminerai cet article par quelques réflexions sur la fracture qui
peuvent arriver au pour de l'arcade de l'os occipital: on sait que cet os est
plus épais de l'os du front, dans la partie supérieure; est très mince et
d'une épaisseur au pour de son arcade, ce qui le rend très fragile en cet
endroit; on sait encore qu'un coup d'une certaine force, dont la direction
seroit perpendiculaire à la partie supérieure de l'os, peut le briser en cet endroit,
et le briser en effet le plus souvent, surtout lorsque la partie supérieure
est brisée: l'ouverture du cadavre, prouve que trop la possibilité de cette
espèce de fracture; qui a toujours été mortelle, parce qu'on n'a pas osé
jusqu'à présent y appliquer le trépan; et que nous avons manqué de signes
univoques suffisants pour nous y déterminer: celui qui se manifeste

(a) L'Esprit et observations de Limbourg tome 2^e page 174. et 175.

Dans les Sujets des observations qu'on vient de rapporter, on peut être le
seul capable de nous éclairer. Dans ces cas extrêmes, on ne saurait
apporter trop d'attention, ni trop de célérité. Le Malade est quelquefois
après beaucoup, pour indiquer lui-même l'endroit de son mal, en y portant
souvent la main, par un mouvement spontané; un chirurgien (a)
me a écrit que M. Fayet chirurgien Principal de la Salpêtrière, avoit eu
habile observation et s'en étoit servi, tripané une femme à laquelle
il sauva la vie, ayant trouvé un épanchement.

Il est même possible qu'il se manifeste quelque violence, quelque contusion,
ou qu'on tâte, le Malade faire quelque mouvement capable de faire
connoître l'endroit de la fracture; et si l'on a dessein d'ouvrir de la
coup, comme, et que le danger soit imminent; qu'on voit par pourquoi on
n'y appliqueroit pas le tripan; ne peut-il pas arriver qu'une fracture
traverse l'arcade, se hant au-dessus; dans ces cas le tripan au-dessus de l'arcade
devient indispensable. J'en ai assez égard être d'un sentiment contraire
à celui de M. Bertrandi (b) qui dit qu'il ne faut pas y appliquer le tripan,
Lors même qu'on découvroit que fût l'endroit ou est l'épanchement
de matière, ou la dépression de l'os; ce qui ajoute-t-il seroit très difficile;
mais la difficulté d'une opération, est-elle une raison de la laisser, si
d'ailleurs elle peut arracher une victime à la mort.

Si une fracture d'os est en cet endroit, dont les ossements implantés dans la dure
mère, a guéri heureusement, le tripan peut guérir de même. quand on a
difficulté, de voir qu'on pourra la surmonter après facilement, en faisant
monter une petite fourche de tripan, sur un manche, auquel on donnera
une poignée d'inextinguible à celle de Villier; ou en se servant de la trépan
angloise, à laquelle M. Sharp donne de grands éloges (c) on s'est bien
qu'il faut éviter l'endroit de l'os le plus latéral, ainsi que la ligne
perpendiculaire, qui sépare l'os en partie droite et gauche; mais
on peut tripaner de dessus l'os, de l'os de l'os; à l'égard de la
hernie d'illuminée par les anciens et quelques modernes; on peut l'ouvrir
en se servant de la plaque de plomb de M. de la Faye (d).

Comme nous avons peu d'observations de fractures de cette partie de l'occipital;
je vais en rapporter une qui se voit dans le rapport de l'os.

17. Observation. En 1759 étant chirurgien major sur le vaisseau d'aloys le Magnifique, qui
seroit parti de la belle meade du Maréchal de Soufflard; un soldat gardé
fût, fut blessé dans le combat, au-dessus de l'arcade de l'os occipital de l'os
gauche, par une balle ou une mitraille; par là ne pouvant trouver le corps qui

(a) M. Duval élève de Bertrandi

(b) traité d'opérations de chirurgie Page 267.

(c) traité des opérations

(d) sous l'opération de l'os de l'os de M. de la Faye Page 414. 4. édition



L'avoit brisé; que j'ay toujours soupçonné avois brisé par ou il avoit enté:
 Le soldat vint me trouver a mon porte, ou j'étois occupé a donner des soins a
 plusieurs grands brisés; il me prioit de lui ôter un brisé, qu'il avoit dans la
 tête, afin qu'il put retourner a son canon dont il étoit le chargé; comme
 il n'avoit point d'hémorragie, je me contentai pour le moment de le sonder
 & aplatir avec le doigt; y ayant trouvé l'os fracturé, je le leur percutai et le
 laissai pour être pansé demain: après avoir pansé aussi avec le
 plus Prépare, je revins a lui, et lui fis une incision circulaire a peu près
 ala largeur; je coupai en travers les muscles trapeze, splénius et complexus;
 je détachai les angles de la plaie pour me donner l'air de tirer les
 fragments d'os, dont deux piquoient la dure mere; j'étais tout occupé,
 et avec le scalpel, l'écureuil et le couteau je détruis les inégalités qui avoient
 piqué cette membrane. La partie de substance de l'os étoit de la
 largeur d'un liard: je pansai la plaie avec un linge imbu d'un
 mélange de miel d'or et de baume de storacine, par dessus un tampon
 de charpie, et je forai les bords de la plaie extérieure de plusieurs
 ouvertures de digestif simple, & externe de compresses et de bandages de galle.
 Je le fis saigner plusieurs fois, et le mis le premier jour a une
 diète sévère.

Cette plaie fut de mieux en mieux, et le Malade n'eut jamais d'autre
 accident, qu'une indigestion, causée par une très grande quantité de
 viande et de boudin, dont il mangea avec orge, environ trois semaines
 après la blessure: Le vaisseau ayant eu ordre de se rendre a Rochefort;
 je le mis a l'hôpital de la Marine de ce port, d'où il partit quelque temps
 après, pour suivre son amiral, et se rendre aux environs de St. Louis en
 Bretagne ou pair: il n'étoit cependant point guéri, mais un aide
 chirurgien qui suivait le détachement, eut soin de le panser tous les jours;
 mon écuyer qui le venoit a visiter, fut fort surpris de voir la plaie,
 a laquelle il trouva un fongus qui s'élevait de dessus la dure mere.
 Le Malade continua de s'en aller et se rendit dans son pair, ou s'est
 terminée la guérison: quelque temps après, j'eus occasion de m'informer
 de son nouvelle, j'appris qu'il étoit marié, et qu'il jouissoit d'une très
 bonne santé.

Cette observation nous prouve clairement, que l'on pourroit se promettre
 les plus heureux succès du trépan appliqué au pôle de l'arcade de l'os
 occipital, si le chirurgien se l'opérant en cet endroit, pour en ôter
 une partie.

Il résulte des observations que l'on vient de voir, que dans les apoplexies
 et les épanchements dans le cerveau; le Malade est entraîné de
 côté, par un mouvement inévitables, auquel la volonté n'a aucune part;
 soit a dire que si l'épanchement est dans la fosse droite, le Malade tombe
 penché de côté gauche; si l'épanchement est dans la fosse gauche, fait tous les efforts
 dont il est capable, pour s'éloigner de l'immobilité qui l'aueble.

Les 9. 10 et 11^{es} observations Prouvent également, qu'un épanchement
Dans le Logis formé par les arêtes et le tégument, donne l'ap-
paré de la saignée, en entraînant la tête du Malade de son côté.

Les 13 et 14^{es} nous montrent qu'on peut en apportant toutes les attentions
nécessaires au moins le épanchement, Logis d'au-dessus ou d'en dessous.

La 17^{es} enfin nous fait voir que l'on peut sans aucun danger, trépaner avec
une arête pour les arêtes de l'os occipital; ce qu'on ne peut pas faire,
ni même os entreprendre; quoiqu'il y ait fracture en cet endroit ne soit pas
de l'os qu'on pourroit se l'imaginer.

Il résulte encore de l'observation de ce signe de l'épanchement et de la
compression; que ceux qui se font à la base du crâne, doivent être plus
manifestes, et que leurs effets doivent être moins sensibles;
La motte et M. Navaton, paroissent l'avoir remarqué.

On pouvoit sans que je le dise que dans un épanchement qui seroit accompagné
d'une violente compression, qui auroit presque totalement suffoqué le
principe de la vie; toutes les situations doivent être à peu près indifférentes au
Malade.

De tout ce qui précède, ne suis-je pas en droit de conclure, que le signe
de la saignée en mémoire; dépend un grand jour du diagnostic de la
place de la tête dans les fontaines; et qu'il indique d'une manière plus
positive, qu'aucun autre, le foyer d'un épanchement, ou d'un dépôt, entre
le crâne et la dure mère, entre elle et la pie-mère, et même dans
la substance du cerveau.

Le principe le plus lumineux que nous ayons de ce célèbre M. Louis (A)
est la paralysie d'un côté du corps: ce symptôme indique que l'épanchement
est dans le cerveau d'un côté opposé; mais il ne marque que la compression
d'un des hémisphères, sans pouvoir nous instruire en quelle Région
est placée la cause comprimante: notre signe indique précisément
la situation.

Quoy qu'aucun auteur n'ait fait attention à ce symptôme, ou voit cependant
quelques uns l'ont entrepris, mais sans en faire aucune application,
ni songer à en faire un précepte: j'ay feuilleté toute ma petite Bibliothèque,
et le seul qui ait dit quelques mots d'approchant, est Delaure, (B)
Lorsqu'il dit en cherchant à expliquer la cause de la paralysie qui arrive
au côté opposé à celui qui est malade; que l'humour contenu dans le
troisième ventricule, pendant dans le quatrième, comprime l'os partie
latérale de la moelle de l'épine, selon qu'elle est plus ou moins comprimée.

(A) d'après l'observation.

(B) Fontaine anatomique Livre de question Sup page 538.



ou de l'un que l'autre; et voilà qu'il paraît que l'appartenance est —
 fortumierement pour les deux et plus basse, d'autant que le Dilep.
 craignant l'adoulum, s'oppose au Dilep. et non au Malade.
 Cet auteur qui semble avoir aperçu la vérité l'a dit dans —
 le même instant.

M. Ludovic dit (a) dans une très bonne dissertation sur les abès
 fœtus, que s'opposant la formation d'un abès le Malade s'efforce quelque
 situation favorable pour diminuer la douleur, et qu'il s'en suit qu'il ne
 souffre point, ou qu'il souffre moins quand il est dans cette situation;
 on doit faire attention à cette circonstance; quelle est utile pour faire
 connaître d'abord le siège et le caractère de la Maladie.

L'illustre Baron de Vain Watten (b) rapporte le mouvement machinal par
 lequel le Dilep. portait la main à l'endroit malade, et que ce signe est d'un
 grand poids, puis qu'on voit beaucoup de ces mouvements automatiques, qui
 ne dépendent en aucune façon de la volonté, et dont l'esprit n'a aucune
 connaissance; par lesquels notre corps tâche d'écarter ce qui pourroit lui nuire;
 cette propriété admirable étant un bien fait de la Providence.

Je pourrais citer encore plusieurs exemples, de différentes situations que
 s'opposent souvent les Malades, qui ont des abès fœtus ou différents endroits
 du corps: on peut voir sur ce sujet de l'honneur fort estimables dans les
 observations 54. 55. 56. et 57 de l'excellent La Motte. (c).

IV. De l'apoplexie.

Dans les épanchemens de l'encéphale interne dit Le célèbre auteur (que pour le
 bien de l'humanité, des objets de la plus grande utilité occupent sans relâche)
 (d) Les symptômes et les indications curatives sont les mêmes, la diversité
 de la cause occasionnelle, ne change pas la nature de la Maladie, qui est
 essentiellement la même; dans l'un et l'autre cas les mêmes signes indiquent
 le siège du mal en effet les observations suivantes nous apprennent, que
 l'apoplexie sanguine, qui est la plus redoutable; résulte souvent pour cause,
 la rupture des vaisseaux sanguins, dont résulte un épanchement mortel. Les
 mêmes observations nous font encore voir, que l'épanchement se trouve quelque
 fois entre le crâne et l'adure mere, d'autres fois entre l'adure et la pie
 mere; mais le plus ordinairement dans le Splein de cette dernière qui
 s'enfoncent dans les anfractuosités du cerveau. Le trepan d'autour par
 lequel pourroit être appliqué utilement; mais l'incertitude du lieu du foyer

(a) collection d'observations sur l'anatomie et la chirurgie extraite de ouvrages
 étrangers tome second.

(b) aphorismes de chirurgie traduction de M. Loyer tome second page 359

(c) traité complet de chirurgie tome premier.

(d) recueil d'observations de l'anatomie et de chirurgie

De l'épanchement, est sans doute l'unique raison qui jusqu'à présent
appartient au Malade, l'insensibilité, qui provient d'autre la vie à quelque ma-
p'ap'udicez en lieu d'après qui n'auraient pas le bonheur d'être échappés.

J'en ay point d'observation sur ce sujet, mais le même signe qui nous indique
le lieu précis d'un épanchement de façon externe; doit nous marquer également
celui de façon interne: M. le Baron de Vauvilliers, en parlant du mouvement
involontaire de la main à l'indroit d'après, dit que ce même phénomène se voit
à l'avant dans les apoplexies. Si donc il n'est possible de reconnaître le lieu
de l'épanchement, dans l'apoplexie sanguine; le tripan pourra of être
employé avec succès: ou le signe de la sensibilité de la main, me parait être celui
qui peut nous donner les fourmissemens les plus positifs sur ce sujet: mais
dans ces cas l'incision de la dure mère sera indispensable.

La Motte en parlant de l'apoplexie dit que si l'on étoit persuadé du lieu
qu'occupe l'épanchement, seroit une nécessité de l'appliquer le tripan, puisque le
Malade n'en mourra pas moins, si le sang ou quelque autre humeur que ce soit,
est descendu ailleurs que dans la dure mère; et qu'au cas que l'épanchement soit
en cet endroit; il n'y a rien de plus sûr que qu'un moment qu'on en aura percé
l'ouverture, le Malade sera en état d'être guéri. Le docteur de Signes
indicateur du lieu de l'épanchement, lui a fait fournir d'appliquer le
tripan sur le frontal, l'occipital et les deux parietaux (a)
ayant vu un homme réduit à la dernière extrémité, par une hémorragie
de l'artère de la dure mère, & venu à quelques jours après l'opération du tripan;
le docteur d'être utile m'a voit fait imaginer depuis long-temps, un instrument
propre à l'artere dans tous les cas; ainsi que celle de l'artere mammaire.
J'allois le faire exécuter, lorsqu'un de mes amis, à qui j'avois communiqué
mon idée, m'en a vu dans un livre nouveau, que j'avois été persuadé par
M. Foulquier.

Il n'est point d'opérateur praticien qui n'ait eu occasion d'observer qu'une
incision faite à la partie antérieure, dans les fontaines de la tête
accompagnée d'un peu de saignée; a souvent fait se lever très promptement ces
membres accablés, en débarrassant le cerveau, et procurant un dégorgement local;
c'est d'après ces observations et l'examen de plusieurs têtes de cer, que j'avois
foncé l'idée de saigner les sinus latéraux par les veines mastoïdiennes
(b) Dans les violentes commotions du cerveau & l'apoplexie, l'asphyxie &
Vertige de. on pourroit étendre ces veines & en tirer par l'application de

(a) traité complet de chirurgie tome second observation 162. page 353 et suivantes

(b) j'ay vu deux & beaucoup de têtes, que le tronc mastoïdien avoit deux lignes de
diamètre extérieurement; et en déchirant la membrane de l'oreille, j'ay quelque fois
tiré très facilement du sang des sinus latéraux par cette veine avec un tuyau
de paille.



Ventouse que l'on scarifieroit ensuite profondément, et pour procurer une plus grande évacuation, on se serviroit des Ventouses scarifiées.

En faisant quelques Recherches sur l'apoplexie, particulièrement à cet égard; j'ai vu que les auteurs qui font mention souvent de l'application des Ventouses Scarifiées à l'occiput; ont entendu parler de ces mêmes Vaisseaux, quoiqu'ils ne les aient point désignés; mais le docteur Jernier (a) dit positivement que M. Morgagni dans son *adversaria anatomica* 6 page. 108. recommande la Saignée à l'occiput dans l'apoplexie, parce que les Vaisseaux de l'occiput, ont entre eux des anastomoses et communiquent avec les Sinus Latéraux. Quant à l'usage de la Scarification à cet égard, j'en ai vu peu de mention dans l'apoplexie.

Après avoir pratiqué les autres Saignées, la Section de ces Vaisseaux pourroit être d'un grand secours, en procurant un dégorgement immédiat du cerveau; on sait que les Saignées Locales, sont de beaucoup supérieures à toutes les autres (b) et que quelque peu de Sang tiré de cette manière, font souvent plus d'effet, que plusieurs Livres tirés d'un endroit éloigné; ce sont des faits constants et l'expérience, qui a souvent porté les auteurs à imaginer d'ouvrir toutes les Vaisseaux importants de la tête, et de la face.

Je sais qu'on peut m'objecter que la Saignée des Vaisseaux jugulaires qui sont plus grosses et qui reçoivent le Sang des ligaments de la tête et de la face, peut être plus utile que les autres; ce qui seroit exactement vrai si l'on ouvroit les jugulaires internes; mais comme on ne peut ouvrir que les externes; le cerveau et ses enveloppes, participeront fort peu à cette évacuation: D'ailleurs les jugulaires ne seulent pas toujours sensibles; et dans ce cas on ne peut les saigner; et peut même arriver que la Ligature favorise ou augmente l'engorgement auquel on se propose de remédier.

Voilà les réflexions et les idées qui m'ont été suggérées par la pratique, et que je soumetts au Jugement de l'Académie Royale de Chirurgie; soit aux illustres membres qui composent cette savante Société, qu'il appartient de décider, si l'on doit faire impuante, la Saignée de l'épanchement et de la compression Locale du cerveau, de ce que j'en ai observé.

On apercevra facilement que je n'ai eu d'autre prétention, que celle de contribuer autant qu'il est en moi, à mieux faire connoître une Maladie, que l'on peut à juste titre regarder comme un fléau des Malades et de la Chirurgie.

(a) Dictionnaire universel de Médecine chirurgie &c. au mot apoplexie colonne. 244.

(b) Voyez le troisième chapitre de l'excellent traité de l'abus de la Saignée.

J'aurais pu ajouter ici quelques remarques sur les hoirs et l'usage
Des topiques et des remèdes internes qui me semblent mériter la
préférence, mais les Lesions de la tête qui ne sont point accompagnées
de plaies; mais elles auroient donné beaucoup plus d'étendue à ce
Mémoire, qui n'est déjà peut être que trop long.
fin.

P. S. Le 10 février 1769. un gardien d'un vaisseau étant ivre, —
tombe à la hauvre de dessus le pont du vaisseau dans la salle; les premiers
aides qui s'y trouvaient furent sans s'alarmation. peu de temps après d'a-
près l'écarter il fut porté à l'hôpital; dans la nuit l'apoplexie augmenta;
Les saignés parurent à l'avois diminuer; mais ce ne fut pour peu de temps.
Le malade devint avec le délire: on fit une incision à l'artère postérieure
du cou Supérieure du parotid gauche; une légère contusion indiquoit
qu'il y avoit eu fracture en cet endroit; on n'en trouva cependant point,
par même des contusion: Le chirurgien qui se procura cette incision, —
Déprima presque totalement l'apoplexie, et le Malade resta dans cet
état jusqu'au 7^e jour de sa blessure; mais dans la nuit du 7 au 8 il
redoubla dans l'apoplexie avec des envies de vomir. Le 9 on fit une
assemblée pour déterminer l'endroit où il falloit appliquer le trépan;
Celui de la contusion parut au premier grand nombre, devoit être préféré, et on
le fit en cet endroit, quoique le Malade n'eût toujours touché de
préférence à un côté droit, et que lorsqu'on le mettoit sur le dos,
sa tête fût entraînée sensiblement de ce côté: quand on le mettoit
sur le côté gauche, il étoit plus assoupé et avoit des bâillements, quelques
uns furent remarqués que le pouls varioit dans un changement
de situation.

Le Malade mourut dans la nuit qui suivit l'opération: L'ouverture
de la tête justifia que la tumeur qu'il avoit au cou et à l'occiput
sur le côté droit, dépendoit d'un épanchement de sang, entre la dure
et la pie-mère, sous le milieu du parotid droit.

M. Dupré chirurgien major de l'hôpital, le démonstrateur et plusieurs
chirurgiens majors de la Marine, informés de mon travail et de mes
observations, fournirent que ce fait y étoit très conforme.



[Faint, mostly illegible handwriting at the top of the page, possibly a title or introductory text.]

[A large block of handwritten text in the middle of the page, written in a cursive script. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.]

[A second large block of handwritten text at the bottom of the page, also mostly illegible.]

AR 45

no 151.